

# Maladies chroniques – Fiche 5

## Tumeurs en Guadeloupe



Données disponibles en 2021

### LES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE (ALD)

Les ALD sont des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (article L.324-1). Depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'Assurance Maladie, l'exonération du ticket modérateur pour l'assuré, est soumise à l'admission en ALD à l'aide d'un protocole de soins établi de façon conjointe entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la Sécurité sociale, signé par le patient. (HAS/www.has-sante.fr)

**Taux standardisé pour 100 000 habitants** : Taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population de référence est celle au recensement de la population de 2015. Les taux standardisés éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et avec les données de la France hexagonale. Les taux sont calculés pour 100 000 habitants.

### LES AFFECTIONS DE LONGUE DUREE – TUMEURS

En France, les cancers représentent la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme selon les estimations réalisées par Santé publique France. Les localisations les plus fréquentes de cancer restent la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme.

Les admissions pour tumeurs (Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique) correspondent à l'ALD 30.

### LES NOUVELLES ADMISSIONS

**En Guadeloupe, plus de 5 000 nouvelles admissions en affection longue durée (ALD) pour tumeurs entre 2017 et 2019, soit en moyenne par an 1 808 nouvelles admissions.**

Sur la période 2017-2019, 5 424 nouvelles admissions en ALD ont eu pour motif une tumeur. Les hommes représentent 55 % (N=2 961) des bénéficiaires vs. 45 % chez les femmes (N=2 463).

Le nombre de nouvelles admissions, en Guadeloupe, a augmenté (+16 %) par rapport à celui enregistré sur la période 2012-2014. L'augmentation est observée pour les deux sexes mais elle est plus importante chez les femmes (+25 %) que chez les hommes (+10 %).

Rapporté à la population, les taux standardisés de nouvelles admissions en ALD pour une tumeur, sur la période 2017 et 2019, sont moins importants en Guadeloupe, qu'en France hexagonale. Le taux est de 532 pour 100 000 habitants pour les hommes en Guadeloupe contre 614/100 000 en France hexagonale.

Pour les femmes, le taux est de 358/100 000 femmes en Guadeloupe et de 497/100 000 en France hexagonale. (Tableau 1)

**Tableau 1. Effectifs et taux standardisés des personnes admises en ALD pour tumeurs selon le sexe**


Hommes					Femmes				
Année	Guadeloupe		France hexagonale		Année	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*		Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2009-2011	2 355	523	491 550	594	2009-2011	1 802	293	448 610	440
2012-2014	2 693	544	499 117	574	2012-2014	1 978	304	480 963	455
2017-2019	2 961	532	579 197	614	2017-2019	2 463	358	553 399	497

Source. CGSS, CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

Entre 2017 et 2019, les classes d'âges les plus représentées sont chez les hommes, les 60-69 ans (35 %) et les 70-79 ans (30 %). Chez les femmes, les classes d'âges les plus représentées sont les 60-69 ans (25 %), et les 50-59 ans (23 %). (Figure1)

**Figure 1. Distribution par sexe et classe d'âge des nouvelles admissions en ALD pour tumeurs en Guadeloupe entre 2017 et 2019**



Source. CGSS, CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

## L'ENSEMBLE DES BENEFCIAIRES

### En Guadeloupe, plus de 11 000 personnes bénéficient du dispositif des affections longue durée (ALD) pour tumeurs en 2019, majoritairement des hommes.

En 2019, 11 166 Guadeloupéens bénéficient de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD pour tumeurs. Les hommes représentent 53 % (N=5 947) des bénéficiaires vs. 47 % (N=5 219) chez les femmes.

En Guadeloupe, le nombre de bénéficiaires a augmenté, en 2019, par rapport à celui enregistré en 2014 (+22%), aussi bien chez les femmes (+26 %) que chez les hommes (+19 %).

Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour motif de tumeur, notifié en 2019, est moins important en Guadeloupe, qu'en France hexagonale, quel que soit le sexe. Le nombre de bénéficiaires est de 3 440 pour 100 000 pour les hommes et de 2 320/100 000 pour les femmes en Guadeloupe et de 3 782/ 100 000 hommes et 3 650/100 000 femmes, en France hexagonale. (Tableau 2)

En France hexagonale, le nombre de bénéficiaires a augmenté dans une moindre mesure, (+11 % entre 2014 et 2019), aussi bien chez les femmes (+13 %) que chez les hommes (+10 %).

**Tableau 2. Effectifs et taux standardisés des personnes en ALD pour tumeurs, selon le sexe**


Hommes					Femmes				
Année	Guadeloupe		France hexagonale		Année	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*		Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2014	5 010	3 027	1 073 301	3 546	2014	4 130	1 889	1 227 291	3 319
2017	6 043	3 484	1 192 376	3 827	2017	4 978	2 224	1 351 219	3 573
2018	6 138	3 529	1 238 312	3 974	2018	5 288	2 356	1 402 306	3 701
2019	5 947	<b>3 440</b>	1 176 713	<b>3 782</b>	2019	5 219	<b>2 320</b>	1 386 011	<b>3 650</b>

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

En 2019, en Guadeloupe, les classes d'âges les plus représentées, étaient, les 70-79 ans (35 %) et les 60-69 ans (27 %) chez les hommes, même constat pour les femmes avec respectivement 24 % et 28 %. (Figure 2)

**Figure 2. Distribution par sexe et classe d'âge des personnes en ALD pour cancer en Guadeloupe en 2019**



Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

## Les principales localisations des cancers

### ○ Chez les hommes

En 2019, la localisation la plus fréquente de cancer chez les hommes est la prostate avec 3 943 personnes en ALD. Les hommes en ALD pour un cancer de la prostate représentent 66 % de l'ensemble des hommes en ALD pour un cancer, quel que soit la localisation. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 14 % par rapport à celui enregistré en 2014.

Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour le cancer de la prostate en 2019 est plus important en Guadeloupe, qu'en France hexagonale. Il est de 2 287 pour 100 000 hommes contre 1 296 pour 100 000 hommes en France hexagonale. (Tableau 3)

**Tableau 3. Effectifs et taux standardisés des principales localisations de cancers pour les hommes en ALD entre 2014 et 2019**

Hommes					
Année	Localisation	Guadeloupe		France hexagonale	
		Effectifs	Taux	Effectifs	Taux
2014	Cancer de la prostate	3 468	2 121	388 585	1 292
	Cancer du côlon-rectum	295	178	118 540	395
	Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	129	75	45 847	147
	Cancer de l'estomac	126	77	14 600	49
2017	Cancer de la prostate	3 983	2 305	409 222	1 316
	Cancer du côlon-rectum	409	237	131 316	423
	Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	167	94	48 476	150
	Cancer de l'estomac	155	92	15 611	51
2019	Cancer de la prostate	3 943	2 287	402 076	1 296
	Cancer du côlon-rectum	401	233	126 233	407
	Cancer de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	147	84	46 319	143
	Cancer de l'estomac	154	92	14 708	48

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

### ○ Chez les femmes

En 2019, la localisation la plus fréquente de cancer chez les femmes est le sein avec 2 472 personnes en ALD. Les femmes en ALD pour un cancer du sein représentent 47 % de l'ensemble des femmes en ALD pour un cancer, quel que soit la localisation. Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 27 % par rapport à celui enregistré en 2014. Rapporté à la population, le nombre de personnes en ALD pour le cancer du sein, en 2019 est moins important en Guadeloupe, qu'en France hexagonale. Il est de 1 098 pour 100 000 femmes en Guadeloupe contre 1 680 pour 100 000 en France hexagonale. (Tableau 4)


**Tableau 4. Effectifs et taux standardisés des principales localisations de cancers pour les femmes en ALD entre 2014 et 2019**

Femmes					
Année	Localisation	Guadeloupe		France hexagonale	
		Effectifs	Taux	Effectifs	Taux
2014	Cancer du sein	1 939	884	587 065	1 596
	Cancer du côlon-rectum	398	182	112 417	285
	Cancer de l'utérus	323	147	72 845	195
	Cancer de l'estomac	123	56	10 190	26
2017	Cancer du sein	2 377	1 064	626 820	1 667
	Cancer du côlon-rectum	508	223	121 839	303
	Cancer de l'utérus	348	153	75 625	199
	Cancer de l'estomac	131	58	10 784	27
2019	Cancer du sein	2 472	1 098	634 772	1 680
	Cancer du côlon-rectum	569	249	122 632	305
	Cancer de l'utérus	378	167	76 121	200
	Cancer de l'estomac	144	64	10 592	27

Source. CGSS. CnamTS, CCMSA, RSI, Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés pour 100 000 habitants

Figure 3. Répartition des principales localisations de cancers en Guadeloupe selon le sexe en 2019



(1) Cancer de l'ovaire, Cancer du système nerveux central, Mélanome, Cancer du larynx, Cancer du foie, Cancer de l'œsophage, Maladie de Hodgkin, Mésotéliome

## LA MORTALITE

**Nombre de décès** : Nombre de décès annuel moyen sur une période de 3 ans

**La cause initiale de décès a été retenue**, définie comme étant la maladie, ou les circonstances en cas de mort violente, à l'origine du processus morbide ayant entraîné le décès.

**Taux standardisé de mortalité** : Taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population de référence est celle au recensement de la population de 2006. Les taux standardisés de mortalité éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et entre zones géographiques.

Les calculs sont effectués sur une période de 3 ans. Les taux standardisés sont calculés pour 100 000 habitants

**Sur la période 2013-2015, un peu plus de 2 000 décès liés à un cancer ont été enregistrés en Guadeloupe, soit en moyenne 678 décès chaque année.**

Le nombre de décès lié à un cancer observé en Guadeloupe sur la période 2013-2015 est de 2 034, soit en moyenne 678 décès annuel. Ce nombre est en hausse par rapport aux précédentes périodes. Ainsi, le nombre de décès par période a augmenté passant de 1 879 sur la période 2007-2009, à 2 005 en 2010-2012 et à 2 034 décès en 2013-2015 et ce peu importe le sexe.

Les taux standardisés de mortalité par cancer observés en Guadeloupe ont diminué de 9 % chez les hommes, passant de 259/ 100 000 en 2007-2009 à 235/ 100 000 hommes sur la période 2013-2015. Les taux ont également diminué (-3%) chez les femmes, passant de 137/100 000 en 2007-2009 à 133/ 100 000 femmes en 2013-2015.

**Tableau 5. Effectifs et taux standardisés de mortalité par cancer selon le sexe**

Périodes	Hommes			
	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2007-2009	1 085	259	267 517	328
2010-2012	1 139	251	267 018	308
2013-2015	1 144	<b>235</b>	270 581	<b>297</b>

Périodes	Femmes			
	Guadeloupe		France hexagonale	
	Effectif	Taux*	Effectif	Taux*
2007-2009	794	137	185 617	167
2010-2012	866	138	191 361	164
2013-2015	890	<b>133</b>	198 468	<b>164</b>


Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants

En France hexagonale, les taux de mortalité par cancer sont plus élevés qu'en Guadeloupe, quel que soit le sexe. Les taux standardisés sont, sur la période 2013-2015 de 297/ 100 000 pour les hommes et 164/100 000 chez les femmes.

On observe également une baisse du taux de mortalité par cancer en France hexagonale entre les périodes 2007-2009 et 2013-2015, chez les hommes (-9%) et chez les femmes (-2%). (Tableau 5)

**Figure 4 – Evolution des taux annuels standardisés de mortalité par cancer en Guadeloupe et en France hexagonale par sexe, entre 2007 et 2015.**



Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG  
\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants

### Principales localisations des cancers à l'origine de la mortalité

**En Guadeloupe, le cancer de la prostate est la première cause de décès chez les hommes, représentant 23% des décès par cancer.**

- Le cancer de la prostate est la première cause de décès par cancer chez les hommes, en Guadeloupe. Il est à l'origine de 87 décès en moyenne par an et représente 23% décès masculins par cancer. Les taux standardisés de mortalité pour le cancer de la prostate observés en Guadeloupe ont diminué de 23% chez les hommes, passant de 77/ 100 000 en 2007-2009 à 59/ 100 000 hommes sur la période 2013-2015.
- Le cancer du côlon-rectum qui est le deuxième cancer en termes de mortalité. Il a causé 11% des décès par cancer en Guadeloupe. Les taux standardisés de mortalité pour le cancer du côlon-rectum observés en Guadeloupe ont augmenté de 32% chez les hommes, passant de 19/ 100 000 hommes en 2007-2009 à 25/ 100 000 sur la période 2013-2015.
- Les cancers des poumons, des bronches et de la trachée (dit cancer du poumon) sont les troisièmes cancers les plus meurtriers, regroupant 10% des décès par cancer sur la période 2013-2015 contre 25% des décès en France hexagonale. Les taux standardisés de mortalité pour le cancer du poumon observés en Guadeloupe ont diminué de 12% chez les hommes, passant de 25/ 100 000 en 2007-2009 à 22/ 100 000 hommes sur la période 2013-2015

Au niveau national, le cancer des voies respiratoires (trachée, bronches, poumon) est la principale cause de mortalité par cancer chez les hommes. (Tableau 6). Les cancers des voies respiratoires représentent 25% des décès par cancer enregistrés chez les hommes en France hexagonale sur la période 2013-2015.

**Tableau 6. Mortalité masculine par cancer en fonction des principales localisations en Guadeloupe et France Hexagonale sur la période 2013-2015**

Hommes						
Localisation	Guadeloupe			France hexagonale		
	Nombre de décès	Part des décès (%)**	Taux*	Nombre de décès	Part des décès (%)**	Taux*
Prostate	261	22,8%	59	25 724	9,5%	30
Côlon-rectum	123	10,8%	25	27 395	10,1%	31
Trachée, des bronches et du poumon	115	10,1%	22	67 601	25,0%	72
Estomac	106	9,3%	22	8 778	3,2%	10
Pancréas	81	7,1%	16	15 947	5,9%	17

Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants ;

\*\*Part des décès selon la localisation par rapport à l'ensemble des décès par cancers

**En Guadeloupe, comme en France hexagonale, le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes, représentant 18% des décès par cancer.**

- Le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine par cancer en Guadeloupe sur la période 2013-2015. Il est responsable de 52 décès en moyenne chaque année. Les Guadeloupéennes sont moins touchées par ce cancer que leurs homologues de la France hexagonale. Le taux standardisé pour cette localisation est de 23 décès pour 100 000 femmes vs. 30 décès pour 100 000 femmes en France hexagonale. (Tableau 7). Les taux standardisés de mortalité pour le cancer du sein observés en Guadeloupe ont augmenté de 5% chez les femmes, passant de 22/ 100 000 en 2007-2009 à 23/ 100 000 femmes sur la période 2013-2015.
- Le cancer du côlon-rectum est la deuxième famille de cancers la plus mortelle pour les femmes (11 % des décès par cancer). Les taux standardisés de mortalité pour le cancer du côlon-rectum observés en Guadeloupe ont augmenté de 7% chez les femmes, passant de 14/ 100 000 en 2007-2009 à 15/ 100 000 femmes sur la période 2013-2015.
- Le cancer de l'utérus représente environ 10% des décès par cancer sur la période 2013-2015. La mortalité régionale par cancer de l'utérus est plus élevée que celle du niveau national (13 décès pour 100 000 femmes en Guadeloupe contre 8 décès pour 100 000 femmes en France hexagonale). Les taux standardisés de mortalité observés en Guadeloupe ont diminué de 13% chez les femmes, passant de 15/ 100 000 en 2007-2009 à 13/ 100 000 femmes sur la période 2013-2015.
- Concernant le cancer du pancréas, les taux de mortalité ont augmenté de 44% chez les femmes, passant de 9/ 100 000 en 2007-2009 à 13/ 100 000 femmes sur la période 2013-2015.

**Tableau 7. Mortalité féminine par cancer en fonction des principales localisations en Guadeloupe et France Hexagonale sur la période 2013-2015**

## Femmes


Localisation	Guadeloupe			France hexagonale		
	Nombre de décès	Part des décès ** (%)	Taux *	Nombre de décès	Part des décès ** (%)	Taux*
Sein	157	17,6%	23	35 948	18,1%	30
Côlon-rectum	97	10,9%	15	23 854	12,0%	19
Pancréas	87	9,8%	13	15 382	7,8%	12
Utérus	86	9,7%	13	10 079	5,1%	8

Source. Inserm (CépiDC), Insee – Exploitation ORSaG

\*Taux standardisés sur l'âge pour 100 000 habitants

\*\*Part des décès selon la localisation par rapport à l'ensemble des décès par cancer

**Figure 5. Répartition des principales localisations mortelles de cancer en Guadeloupe sur la période 2013-2015 selon le sexe.**



(1) Cancer de la plèvre, Cancer du testicule et des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés, Maladie de Hodgkin, Cancer de la thyroïde, Mélanome malin de la peau, Cancer de l'os, cartilage articulaire, Cancer du rein, Cancer du larynx, Cancer de la vessie, Cancer de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques, Cancer du système nerveux central

FINANCEMENT



Imm. Le Squale, rue René Rabat  
Houelbourg sud II  
97122 BAIE-MAHAULT  
**0590 47 61 94**

[www.orsag.fr](http://www.orsag.fr)

[info@orsag.fr](mailto:info@orsag.fr)

